



РОСВЕТФАРМ

Профилактика и лечение гинекологических заболеваний крупного рогатого скота



1 Оксилат

Профилактика и лечение послеродовых эндометритов и других воспалительных заболеваний матки у коров и синдрома метрит-мастит-агалактия у свиней
Действующие вещества: трекрезан, никотиновая кислота
Форма выпуска: флакон - 20 мл, 50 мл, 100 мл

2 Гинодиксин

Лечение послеродовых эндометритов
Действующие вещества: диоксидин, трекрезан
Форма выпуска: флакон - 400 мл

3 Хинасепт-гель

Профилактика и лечение послеродовых эндометритов, вульвовагинитов
Действующее вещество: хинозол
Форма выпуска: флакон - 400 мл

4 Ихглуковит-РВФ

Профилактика и лечение эндометритов и субинволюции матки
Действующие вещества: ихтиол, глюкоза, аскорбиновая кислота, спирт
Форма выпуска: флакон - 100 мл, 200 мл

5 Тривитамин А, Дз, Е

Профилактика и лечение гиповитаминозов А, Дз, Е и заболеваний, развивающихся на их фоне.
Применяют для проведения комплексных профилактических мероприятий при бесплодии.
Действующие вещества: Витамин А, витамин Дз, витамин Е
Форма выпуска: раствор для инъекций - 100 мл

Наши контакты:

Россия, 630501, Новосибирская область, р.п. Краснообск, здание ФГБНУ ИЭВСидВ, к.125

+7(383) 308-76-09, 348-35-94 ros@rosvetfarm.ru www.rosvetfarm.com

rosvetfarm rosvetfarm



СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ

Дни лечения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Профилактика задержания плаценты, послеродового эндометрита	[Timeline bar]										
Схема 1 (терапия начинать не позднее 5-6 часов после отела)	Оксилат	Оксилат									Тривитамин
	Хинасепт-гель	Хинасепт-гель									
	Тривитамин										
Профилактика послеродового эндометрита	[Timeline bar]										
Схема 2 (терапия начинать в день отела)	Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ								Тривитамин
	Хинасепт-гель	Хинасепт-гель									
	Тривитамин										
Лечение задержания плаценты, послеродового эндометрита	[Timeline bar]										
Схема 3	Оксилат	Оксилат	Оксилат	Оксилат	Оксилат*						Тривитамин
	Хинасепт-гель	Хинасепт-гель	Хинасепт-гель	Хинасепт-гель*	Хинасепт-гель*						
	Тривитамин										
Лечение послеродового эндометрита	[Timeline bar]										
Схема 4	Оксилат	Оксилат	Оксилат	Оксилат	Оксилат*						Тривитамин
	Гинодиксин	Гинодиксин	Гинодиксин	Гинодиксин	Гинодиксин*						
	Тривитамин										
Схема 5	Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ*		Ихглуковит-РВФ*
	Хинасепт-гель	Хинасепт-гель	Хинасепт-гель	Хинасепт-гель*	Хинасепт-гель*						
	Тривитамин										Тривитамин
Схема 6	Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ*		Ихглуковит-РВФ*
	Гинодиксин	Гинодиксин	Гинодиксин	Гинодиксин	Гинодиксин*						
	Тривитамин										Тривитамин
Лечение субинволюции матки	[Timeline bar]										
Схема 7	Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ		Ихглуковит-РВФ*		Ихглуковит-РВФ*
	Тривитамин										Тривитамин

* Зависит от тяжести заболевания

Гинодиксин - 100 мл/гол., внутриматочно

Хинасепт-гель - 50 мл/гол. (профилактика), 100 мл/гол. (лечение), внутриматочно

Оксилат - 5 мл/100 кг, но не более 20 мл/гол. в передневерхний угол прямокишечной ямки справа или слева от анального отверстия

Ихглуковит-РВФ - 10 мл/100 кг м.т., в передневерхний угол прямокишечной ямки справа или слева от анального отверстия

Тривитамин - 2,5 мл/гол., внутримышечно

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И НОСЯТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ!